

Link do produktu: <https://www.leczeniejelit.pl/test-histamina-w-kale-i-jelitowa-produkcja-histaminy-p-15.html>



## Histamina w kale i jelitowa produkcja histaminy

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>399,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |

### Opis produktu

#### Histamina w kale i jelitowa produkcja histaminy

Histamina, naturalnie występująca w wielu pokarmach, może być również wytwarzana przez bakterie w przewodzie pokarmowym. To badanie pozwala nie tylko na zmierzenie ilości histaminy w kale, ale również określa, czy jest ona produkowana w nadmiarze przez mikrobiotę jelitową. Taka analiza jest kluczowa dla osób cierpiących na nietolerancję histaminy.

**Technika badania:** Wykorzystujemy metodę immunoenzymatyczną (ELISA) do ilościowego oznaczania histaminy, co pozwala na dokładne określenie jej poziomów w kale oraz produkcji przez bakterie jelitowe.

#### Kiedy warto rozważyć wykonanie badania:

- Gdy występują przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe: wzdęcia, biegunki, zaparcia, bóle brzucha czy refluks.
- Przy problemach skórnych takich jak rumień, zaczerwienienia, pokrzywka, świąd skóry czy trądzik.
- Dla symptomów neurologicznych, w tym bóle głowy, migreny, zawroty głowy, mdłości oraz zaburzenia snu i koncentracji.
- W przypadku dolegliwości oddechowych: kaszel, duszności, wodnisty katar, kichanie, zatykanie nosa.
- Dla objawów kardiologicznych, takich jak arytmie serca i nadciśnienie tętnicze.
- W sytuacji bolesnych i obfitych miesiączek.

#### Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału:

Standardowe wypróżnienie; kał oddać na oryginalny przyklep na deskę (dostępny w Instytucie) lub na rozpiętą nad toaletą folię stretchową, materiał pobrać z 8 miejsc z jednego wypróżnienia i umieścić w pojemniczku, wypełniając go do  $\frac{3}{4}$  objętości.

Kał dostarczyć niezwłocznie do laboratorium, maksymalnie w 48 godzin od pobrania.

W przypadku temperatury powietrza powyżej +25°C materiał należy zabezpieczyć wkładem chłodzącym; nie zamrażać; możliwa wysyłka materiału.

Przeciwwskazania do wykonania badania: Brak.

Czas oczekiwania na wynik/sposób odbioru wyniku:

4 tygodnie/odbior osobisty, wysyłka drogą poczty elektronicznej, wysyłka pocztą, wysyłka kurierem. W przypadku równoczesnego zlecenia kilku parametrów o różnym czasie oczekiwania na wynik, obowiązuje najdłuższy z nich.

**WAŻNE:** pacjenci przyjmujący > 5mg biotyny/dzień powinni utrzymać min 24h przerwy od przyjęcia preparatu do momentu pobrania próbki w celu oznaczenia poziomu histaminy w kale.

### Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału

#### Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału:

---

Standardowe wypróżnienie; kał oddać na oryginalny przylepiec na deskę (dostępny w Instytucie) lub na rozpiętą nad toaletą folię stretchową, materiał pobrać z 8 miejsc z jednego wypróżnienia i umieścić w pojemniczku, wypełniając go do  $\frac{3}{4}$  objętości.

Kał dostarczyć niezwłocznie do laboratorium, maksymalnie w 48 godzin od pobrania.

W przypadku temperatury powietrza powyżej +25°C materiał należy zabezpieczyć wkładem chłodzącym; nie zamrażać; możliwa wysyłka materiału.

Przeciwwskazania do wykonania badania: Brak.

Czas oczekiwania na wynik/sposób odbioru wyniku:

4 tygodnie/odbior osobisty, wysyłka drogą poczty elektronicznej, wysyłka pocztą, wysyłka kurierem. W przypadku równoczesnego zlecenia kilku parametrów o różnym czasie oczekiwania na wynik, obowiązuje najdłuższy z nich.

**WAŻNE:** pacjenci przyjmujący > 5mg biotyny/dzień powinni utrzymać min 24h przerwy od przyjęcia preparatu do momentu pobrania próbki w celu oznaczenia poziomu histaminy w kale.