

Link do produktu: <https://www.leczeniejelit.pl/test-mikrobiota-jelit-basic-analiza-mikroorganizmow-bakterii-i-grzybow-w-przewodzie-pokarmowym-p-11.html>



Mikrobiota jelit Basic

Cena	490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Mikrobiota jelit Basic

Mikrobiota jelit Basic to analiza mikroorganizmów, w tym bakterii i grzybów, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy. Do badania pobierany jest kał, który następnie poddawany jest ilościowemu posiewowi mikrobiologicznemu. Dzięki tej metodzie możemy dokładnie ocenić obecność i ilość 19 kluczowych mikroorganizmów jelitowych, które mają znaczenie kliniczne.

Nasze badanie obejmuje ilościową ocenę drobnoustrojów wskaźnikowych, w tym:

- Beztlenowce z rodzajów Bacteroides i Bifidobacterium
- Bakterie z rodzaju Enterococcus
- Pałeczki Escherichia coli
- E. coli tzw. postać bioware (bez właściwości immunostymulujących)
- Beztlenowe łaseczki z rodzaju Clostridium
- Pałeczki kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, w tym produkujące nadtlenuk wodoru
- Pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae: Proteus spp., Providencia spp., Morganella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Hafnia alvei
- Niefermentujące pałeczki z rodzaju Pseudomonas
- Inne bakterie indywidualne dla pacjenta
- Całkowitą liczbę bakterii
- Inne parametry: pH kału, konsystencja kału
- Grzyby drożdżopodobne

Materiał do badania: Kał, maksymalny czas przydatności do 72 godzin od pobrania.

Metoda badania: Ilościowy posiew mikrobiologiczny.

Badanie zaleca się przeprowadzić w przypadku:

- zaburzeń żołądkowo- jelitowych,
- zespół jelita nadwrażliwego,
- nieswoistych chorób zapalne jelit,
- alergii pokarmowych,
- objawów alergicznych,
- atopowego zapalenia skóry,
- kataru siennego lub innego,
- częste infekcje o etiologii bakteryjnej i/lub wirusowej,
- profilaktyczna ocena mikroflory jelit (szczególnie po przebytej antybiotykoterapii), podejrzenie zwiększonej kolonizacji grzybiczej przewodu pokarmowego

Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału:

Standardowe wypróżnienie; kał oddać na oryginalny przyklepic na deskę (dostępny w Instytucie) lub na rozpiętą nad toaletą folię stretchową, materiał pobrać z 8 miejsc z jednego wypróżnienia i umieścić w pojemniczku, wypełniając go do $\frac{3}{4}$ objętości.

Kał należy dostarczyć niezwłocznie do laboratorium, najpóźniej do 72 godzin od pobrania.

W przypadku temperatury powietrza powyżej +25°C materiał należy zabezpieczyć wkładem chłodzącym; możliwa wysyłka

materiału.

Przeciwwskazania do wykonania badania: antybiotykoterapia aktualnie przyjmowana lub w ostatnich 4 tygodniach oraz terapia przeciwgrzybicza aktualnie przyjmowana lub w ostatnich 4 tygodniach, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Czas oczekiwania na wynik/sposób odbioru wyniku: 15 dni roboczych/odbior osobisty, wysyłka drogą poczty elektronicznej, wysyłka pocztą, wysyłka kurierem. W przypadku równoczesnego zlecenia kilku parametrów o różnym czasie oczekiwania na wynik, obowiązuje najdłuższy z nich.

Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału

Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału:

Standardowe wypróżnienie; kał oddać na oryginalny przylepiec na deskę (dostępny w Instytucie) lub na rozpiętą nad toaletą folię stretchową, materiał pobrać z 8 miejsc z jednego wypróżnienia i umieścić w pojemniczku, wypełniając go do $\frac{3}{4}$ objętości.

Kał należy dostarczyć niezwłocznie do laboratorium, najpóźniej do 72 godzin od pobrania.

W przypadku temperatury powietrza powyżej +25°C materiał należy zabezpieczyć wkładem chłodzącym; możliwa wysyłka materiału.

Przeciwwskazania do wykonania badania: antybiotykoterapia aktualnie przyjmowana lub w ostatnich 4 tygodniach oraz terapia przeciwgrzybicza aktualnie przyjmowana lub w ostatnich 4 tygodniach, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.