

Link do produktu: <https://www.leczeniejelit.pl/test-mikrobiota-jelit-basic-analiza-mikroorganizmow-bakterii-i-grzybow-w-przewodzie-pokarmowym-p-14.html>



Poziom DAO we krwi

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Poziom DAO we krwi :

Badanie poziomu enzymu DAO jest kluczowe dla osób podejrzewających nietolerancję histaminy. Niski poziom tego enzymu może przyczyniać się do trudności w metabolizowaniu histaminy, co z kolei może prowadzić do różnorodnych dolegliwości. Histamina, która nie jest odpowiednio rozkładana, może wywoływać symptomy skórne, jelitowe oraz neurologiczne, w tym migreny.

Technika badania: Ilościowe oznaczenie poziomu DAO przeprowadzane jest przy użyciu próbki surowicy krwi włośniczkowej, pobranej z palca.

Metoda badania: metoda immunoenzymatyczna ELISA

Kiedy warto rozważyć wykonanie badania:

- Objawy gastryczne: wzdęcia, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, skurcze, refluks żołądkowo-przełykowy.
- Problemy skórne: takie jak rumień, zaczerwienienia, pokrzywka, świąd skóry, trądzik.
- Objawy neurologiczne: bóle głowy, migreny, zawroty głowy, mdłości, zaburzenia cyklu snu i czuwania, zmniejszona koncentracja.
- Objawy oddechowe: kaszel, duszności, wodnisty katar, kichanie, zatłoczony nos.
- Problemy z układem krążenia: arytmie serca, nadciśnienie tętnicze.
- Menstruacyjne dolegliwości: bolesne i obfite miesiączki.

Jeżeli inne potencjalne przyczyny wymienionych dolegliwości zostaną wykluczone i stosowane terapie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zaleca się sprawdzenie poziomu DAO w celu potwierdzenia lub wykluczenia nietolerancji histaminy.

Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału:

Pobranie krwi kapilarnej może być wykonane samodzielnie przez pacjenta zgodnie z dostarczoną wraz z zestawem instrukcją pobrania.

Materiał należy dostarczyć do laboratorium Instytutu Mikreokologii w przeciągu maksymalnie 48 godzin od pobrania.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 25°C materiał należy zabezpieczyć wkładem chłodzącym. Materiał można dostarczyć wysyłkowo lub osobiście.

Przeciwwskazania do wykonania badania: badanie nie powinno być wykonywane w ciąży oraz u noworodków (Czas oczekiwania na wynik/sposób odbioru wyniku:

4 tygodnie/odbior osobisty, wysyłka drogą poczty elektronicznej, wysyłka pocztą, wysyłka kurierem. W przypadku równoczesnego zlecenia kilku parametrów o różnym czasie oczekiwania na wynik, obowiązuje najdłuższy z nich.

WAŻNE: niektóre leki np. stosowanie heparyny wpływa na wzrost poziomu DAO oraz stosowanie diety niskohistaminowej przed wykonaniem oznaczenia DAO mogą wpłynąć na poziom enzymu, stąd wyniki należy interpretować z uwzględnieniem tych czynników.

Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału

Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału:

Pobranie krwi kapilarnej może być wykonane samodzielnie przez pacjenta zgodnie z dostarczoną wraz z zestawem instrukcją pobrania.

Materiał należy dostarczyć do laboratorium Instytutu Mikreologii w przeciągu maksymalnie 48 godzin od pobrania.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 25°C materiał należy zabezpieczyć wkładem chłodzącym. Materiał można dostarczyć wysyłkowo lub osobiście.

Przeciwwskazania do wykonania badania: badanie nie powinno być wykonywane w ciąży oraz u noworodków (